


الفبای مراجعه به آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی



آزمایشگاه تخصصی دکتر چپرلی

انجام کلیه آزمایش‌های روتین، تخصصی و فوق تخصصی

طرف قرارداد با کلیه بیمه‌ها

کنبد، خیابان دارایی غربی، بعد از چهارراه اول، ساختمان پزشکان دکتر آقچلی

تلفن: ۰۱۷۲-۲۲۲۱۵۸۱-۲۲۹۵۵۵۰

www.Drcheperlilab.com

دستور العمل قند خون ۲ ساعت پس از غذا

- شب قبل از آزمایش حداقل ۸ ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمایید.
- پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خورید را میل نمایید.
- وقتی اولین لقمه صبحانه را خوردید ساعت را یادداشت کنید. نمونه گیری دقیقاً ۲ ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد
- حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید.
- قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین ۲ ساعت بعد سیگار نکشید.
- در طول آزمایش (در طی ۲ ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری نمایید.
- آزمایش را حتماً قبل از ساعت ۱۰ صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعت دیرتر اجتناب کنید.
- در طی این دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی (آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمایید.
- آزمایش قند ناشتا و دو ساعت پس از غذا را در یک روز انجام دهید.



پیشگفتار

همه آزمایش‌ها نیاز به آمادگی قبلی ندارند اما انجام بیشتر آزمایش‌ها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات گردند موجب رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی می‌شوند. شاید پرسشی که بیش از دیگر سوالات از سوی بیماران مطرح می‌شود مسئله **ناشتایی** است. بدیهی است که شما باید معنای دقیق ناشتا بودن را بدانید.

به طور کلی منظور از ناشتایی این است که:

- نباید طی ۱۲ ساعت پیش از انجام آزمایش غذا بخورید.
- نباید طی ۱۲ ساعت پیش از آزمایش، مایعات بنوشید (خوردن آب طبق رژیم عادتی هر شخص اشکالی ندارد).
- نباید طی ۱۲ ساعت قبل از آزمایش آدامس بجوید.
- نباید از شکلات‌های مختلف، مینت (ترکیبات نعناع دار)، شربت‌های سینه یا قرص‌های نرم کننده گلو استفاده نمایید.

پس اگر آزمایشی که پزشک شما درخواست نموده نیاز به ناشتایی دارد، شما:

- می‌توانید در طول ۱۲ ساعت پیش از انجام آزمایش آب بنوشید.
- باید داروهایی را که پزشک اجازه قطع مصرف آنها را صادر نکرده، مثل گذشته مصرف نمایید (اما آزمایشگاه را از مصرف آنها آگاه کنید).
- می‌توانید طی ۱۲ ساعت پیش از آزمایش دندان‌هایتان را مسواک کنید.

نکته مهم دیگر آگاه بودن آزمایشگاه از سوابق دارویی و بیماری شماست؛ در صورتی که بیماری خاصی دارید یا داروی بخصوصی مصرف می‌کنید حتماً آزمایشگاه را مطلع سازید.

نمونه‌های آزمایشگاهی

ارائه نمونه درست به آزمایشگاه بسیار مهم است؛ به همین خاطر به دستورالعمل‌ها و آمادگی‌های لازم برای انجام آزمایش‌های مهم و رایج در آزمایشگاه‌ها می‌پردازیم.

توجه داشته باشید که:
بهترین نمونه برای تشخیص عفونت های ادراری
نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.

در برخی از آزمایش ها، ممکن است نیاز به
ناشتایی بیشتر یا کمتر از ۱۲ ساعت وجود داشته باشد؛
یا در برخی موارد دیگر باید بعضی از داروها را قطع
کرد و کشیدن سیگار را متوقف نمود.

- درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید؛ بدون آن که دست شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
- با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیش ابراه را از جلو به عقب تمیز کنید. این کار را دوبار و هر بار با یک دستمال جدید تکرار کنید.
- پس از اینکه جریان ادرار شروع شد، قسمت اولیه ادرار (چند قطره اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم ۳۰ میلی لیتر (حداقل نصف ظرف) جمع کنید. توجه داشته باشید که ظرف مذکور تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند.
- درب ظرف نمونه را بسته و آن را به آزمایشگاه تحويل دهید.

ویژه آقایان

- پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید.
- دست های خود را کاملاً با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.
- درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید؛ بدون آن که دست های شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند
- سر آلت را با دستمال مرطوب یکبار مصرف دوبار و هر بار با استفاده از یک دستمال جدید تمیز کنید.
- مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد.
- مقدار کمی از قسمت اول ادرار (چند قطره اول) را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود ۳۰ میلی لیتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع کنید.
- درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحويل آزمایشگاه دهید.

دستورالعمل آزمایش ۲ ساعته تحمل قند خون (2hOGTT)

- شب قبل از آزمایش حداقل ۸ ساعت ناشتا باشید.
- ابتدا یک نمونه خون جهت تعیین قند خون ناشتا از شما گرفته شده و سپس به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ۱/۷۵ گرم (حداکثر ۷۵ گرم) قند به شما داده می شود تا میل کنید.
- توجه داشته باشد که نباید هیچ ماده ای برای بهتر شدن طعم محلول قند به آن اضافه کنید. فقط می توان مقداری آبلیمو به آن اضافه نمود تا طعم آن قابل تحمل باشد. محلول قندی تهیه شده را در طی مدت ۵ دقیقه به آرامی بنوشید.
- دقیقاً ۲ ساعت پس از شروع مصرف محلول قند، نمونه خون از شما گرفته می شود.
- مواردی که در ۵ بند آخر دستورالعمل قند خون ۲ ساعت پس از غذا آمده است را در این مورد نیز رعایت فرمائید.

دستورالعمل جمع آوری ادرار تمیز برای کشت و آزمایش کامل ادرار

نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود برخی از مواد و سلول ها از جمله قند، پروتئین، خون، گلbulول های سفید و گلbulول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود.

اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده شود نتایج آزمایش ادرار و کشت آن خصوصاً از نظر تشخیص عفونت ها دچار اشکال خواهد شد، لذا باید نکات زیر را رعایت نمود:

ویژه بانوان:

- پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمائید.
- دست های خود را کاملاً با صابون و آب شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.

توجه ۲:

در صورت امکان ادار را مستقیماً داخل گالن نریزید و از ظرف های استریل ادار جهت این کار استفاده نمایید.

- در طول جمع آوری ادار باید ظرف جمع آوری دور از دسترس کودکان و در جای خنک (ترجیحاً در یخچال) نگهداری شده و بلافصله پس از اتمام کار به آزمایشگاه تحویل داده شود.

دستور العمل جمع آوری نمونه مدفوع

raig ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماری زا در روده است. افرادی که تحت آزمایش مدفوع قرار می گیرند، باید برای مدت ۷ تا ۱۰ روز پیش از انجام این آزمایش از درمان با روغن کرچک یا روغن های معدنی، بیسموت، منیزیوم، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک ها خودداری نمایند. بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود. نمونه مدفوع باید مستقیماً در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار می گیرد جمع آوری شود. اگر بیمار بستری است، نمونه را در یک ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آبسلانگ)، نمونه را به ظرف برچسب دار منتقل نمایید. نمونه مدفوع نباید با ادار را آب آلوده شود زیرا ادار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد.

بیماران باید نمونه جمع آوری شده را خصوصاً در موارد مشکوک به اسهال خونی بلافصله به آزمایشگاه تحویل دهند. اگر انجام آزمایش حداقل تا ۳۰ دقیقه پس از جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد، لازم است تا نمونه در یخچال قرار داده شود.

آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع

گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق می افتد که به علت کم بودن با چشم دیده نمی شود، بنابراین باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود. بهتر است این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود.

مراجعه کننده گرامی:

- در صورتی که نمونه ادار در منزل تهیه می شود:
- حتماً پس از جمع آوری ادار باید آن را در طبقه پائین درب یخچال قرار دهید.
 - نمونه ادار را تقریباً تا ۱۲ ساعت پس از جمع آوری می توان در یخچال نگهداری نمود.
 - در زمان انتقال نمونه ادار به آزمایشگاه آن را در کنار یخ قرار دهید.

دستور العمل جمع آوری ادار ۲۴ ساعته

نمونه ادار ۲۴ ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماری ها مخصوصاً بیماری های کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه باید دقیقاً طی ۲۴ ساعت جمع آوری گردد. به همین منظور گالن هایی از سوی آزمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد که برخی از آنها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد است. نکته مهم این است که شما نباید تحت هیچ شرایطی این مواد را خالی کرده یا آنها را بو کنید. برای جمع آوری ادار ۲۴ ساعته هیچگاه از ظرفی غیر از ظرف هایی که آزمایشگاه در اختیار شما قرار می دهد استفاده نکنید.

ضمناً رعایت موارد ذیل ضروری است:

- در ابتدای جمع آوری نمونه، دفع ادار را انجام داده و آن را دور بریزید. زمان را دقیقاً یادداشت کنید (مثلاً ساعت ۷ صبح).
- به مدت یک شبانه روز (۲۴ ساعت) یعنی تا ساعت ۷ صبح فردا تمامی نوبت های دفع ادار را در ظرف مخصوص جمع آوری کنید.

توجه ۱:

آخرین نوبت دفع ادار باید رأس همان ساعتی که جمع آوری ادار شروع شده بود، انجام و در ظرف مخصوص جمع آوری نمونه ریخته شود.



نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست.

- باید دقت شود که تمام نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا در غیر این صورت باعث به دست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد.
- قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف، دمای آن را به حدود ۳۷ درجه سانتی گراد (درجه حرارت بدن) برسانید.
- از قرار دادن نمونه در حرارت‌های کمتر از ۳۰-۳۷ درجه و بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحويل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن (۳۷ درجه سانتی گراد) نگهداری کنید.

آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله‌ها در مردان (وازکتومی)

- انجام آزمایش منی در این افراد مانند آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که:
- این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله‌ها انجام شود.
- در طی ۲۴ ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.
- در صورتی که نمونه در خارج آزمایشگاه تهیه شده است، باید هر چه سریعتر به آزمایشگاه منتقل شود.

توجه:

نمونه مایع منی که از زمان جمع آوری آن پیش از نیم تا یک ساعت گذشته باشد، قادر ارزش تشخیصی است.

- برای انجام این آزمایش باید نکات زیر را رعایت نمایید:
- ۴۸-۷۲ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ و ماکیان)، ماهی، شلغم و تربچه خودداری کنید.
 - مصرف قرص‌های آهن و فرفولیک، کپسول هماتینیک و ففول، ایندومتاسین، کلشیسین، آسپیرین، بروفن، کورتون‌ها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود. در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسوک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمایید.
 - نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحويل داده شود.
 - نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.

دستور العمل جمع آوری نمونه مایع منی

آزمایش بر روی مایع منی به منظور تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- نمونه باید ترجیحاً در آزمایشگاه تهیه شود، در غیر این صورت باید آن را در مدت کمتر از نیم تا یک ساعت به آزمایشگاه تحويل داد. در هنگام تحويل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمایید.

- نمونه باید پس از ۳ تا ۵ روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه‌هایی که پیش از دو روز یا پس از هفت روز از آخرین نزدیکی جمع آوری می‌شود برای انجام آزمایش مناسب نیست.

- وجود تب در خلال ۳ روز پیش از انجام آزمایش، نتیجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بهترین نمونه منی نمونه‌ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شده و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده، جمع آوری می‌گردد.

در صورت مصرف دارو حتماً باید با پزشک مربوطه در مورد قطع یا ادامه مصرف آنها گفتگو نمایید و آزمایشگاه را از این موضوع مطلع سازید.

۲- آزمایش پرولاکتین

پرولاکتین که از بخشی از مغز (هیپوفیز) ترشح می‌شود هورمونی است که در طی دوره حاملگی و شیردهی ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد. انجام این آزمایش در اختلالات هورمونی از جمله به هم خوردن نظم عادت ماهیانه در خانم‌ها و نیز بیماران مشکوک به تومور هیپوفیز کمک کننده است.

بیماران باید نکات زیر را پیش از انجام این آزمایش رعایت کنند:

۱- باید حداقل ۲ ساعت و حداقل ۳ ساعت بعد از بیدار شدن از خواب نمونه خون بدهنند. نمونه‌هایی که زودتر از این زمان تهییه شوند افزایش ناشی از خواب را نشان خواهند داد.

۲- در شب قبل از آزمایش، لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشیدن لباس‌های تنگ خصوصاً در ناحیه سینه و پستان‌ها اجتناب نمایند.

۳- معاينه و نیز تحریک پستان‌ها طی ۲۴ ساعت قبل موجب اشتباه در نتیجه آزمایش می‌شود.

۴- بیماران باید از نزدیکی و تماس جنسی در شب قبل خودداری کنند.



آمادگی‌های لازم جهت آزمایش شناخت زودرس سرطان دهانه رحم

نام دیگر آن، آزمایش پاپ اسمیر است. این آزمایش به منظور شناخت زودرس سرطان دهانه رحم انجام می‌شود و به علاوه در زمان انجام آن می‌توان به التهاب دهانه رحم و عفونت‌های آن نیز پی‌برد. رعایت چند نکته پیش از انجام این آزمایش ضروری است:

- از ۷۲ ساعت قبل از انجام آزمایش از دوش واژینال (شستشوی داخل واژن با آب یا مواد ضد عفونی کننده) پرهیز نمایید.
- از نمونه برداری در زمان قاعده‌گی، خونریزی فعال یا دوره‌های التهابی اجتناب کنید.

آزمایش PSA جهت افتراق توده‌های خوش‌خیم و بدخیم پروستات

انجام این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی در آقایان توصیه می‌شود (بطور منظم و حداقل سالی یکبار).

- در صورتی که اخیراً معاينه پروستات شده اید آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق بیندازید.
- حداقل باید ۴۸ ساعت از آخرین انزال (مقاربت یا دفع منی به هر نحو) گذشته باشد.
- در صورتی که اخیراً از پروستات سونوگرافی کرده‌اید جواب آن را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید.

آزمایش‌های رایج هورمونی

۱- آزمایش هورمون‌های تیروئید

- هر چند انجام آزمایش هورمون‌های تیروئید نیاز به رعایت محدودیت مصرف غذا و مایعات ندارد اما به علت اثری که افزایش چربی‌های خون بر نتایج آزمایش‌های تیروئید دارد، حداقل ۳ ساعت قبل از آزمایش، غذا نخوردید.



پیش از اینکه این اختلالات موجب صدمه به نوزاد شود آن ها را بطور کامل درمان نمود. مهم ترین این اختلالات **بیماری های تیروئید** است.

- توجه داشته باشید که ظاهر سالم نوزاد خصوصاً در روزهای اول تولد این اختلالات را رد نمی کند. در حال حاضر انجام تست های تیروئید، فاویسم و بیماری فنیل کتونوری در کشور الزامی است.

چند نکته مهم:

- **آزمایش قند خون ناشتا** را پس از ۸ ساعت ناشستایی انجام دهید. (توجه داشته باشید که این مدت ناشستایی باید در طی شب باشد.)

- **آزمایش تری گلیسیرید** (یکی از چربی های خون) حداقل نیاز به ۱۲ ساعت ناشستایی دارد.

- برای انجام **آزمایش نیتروژن اوره خون (BUN)** ۴-۸ ساعت ناشستایی کافی است؛ بعلاوه بیمار باید حداقل در طی ۳-۲ روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای حاوی گوشت زیاد خودداری نماید. انجام این آزمایش در کنار **آزمایش کراتینین** اطلاعات دقیق تری از نحوه عملکرد کلیه ها در اختیار پزشک معالج قرار خواهد داد.

- انجام **آزمایش اسید اوریک و اوره خون** نیاز به حداقل ۸ ساعت ناشستایی دارد.

- آزمون تعیین عیار **پادتن ضد میکروب هلیکوباتر پیلوری** که یکی از عوامل مهم مولد ورم و زخم های معده است نیاز به آمادگی خاصی ندارد اما بهتر است که بیمار شب قبل غذای چرب مصرف نکند زیرا افزایش چربی خون می تواند نتیجه این آزمایش را مخدوش نماید.

۵- طی ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش از ورزش و فعالیت های شدید بدنی خودداری نموده و مصرف قرص های ضدبارداری، کلروپرومازین و متیل دوپا را پس از مشورت با پزشک معالج قطع نمایند.

۶- استرس در زمان انجام آزمایش خصوصاً در طی ۳۰ دقیقه پیش از آن موجب نتایج اشتباه می شود، لذا بیماران باید استرس خود را در زمان آزمایش به حداقل برسانند.

آزمون های غربالگری بیماری های مادرزادی در مادران باردار

امروزه با انجام آزمایش هایی از جمله **آزمایش های چهار گانه (کوادرابل)** که بر روی نمونه خون مادر انجام می شود و یا **آزمایش ترکیبی** که شامل آزمایش خون از مادر و نیز انجام نوعی سونوگرافی خاص از جنین است، می توان به تشخیص زودرس سندروم داون (که در گذشته به آن منگولیسم می گفتند و مهمترین علامت آن ناتوانی شدید ذهنی است) و ناهنجاری ها و نقایص لوله های عصبی (مغز و نخاع) رسید. ایده آل ترین زمان برای انجام آزمایش چهار گانه بین هفته های ۱۶ تا ۱۸ حاملگی و بهترین زمان انجام تست ترکیبی **هفته یازدهم بارداری** (بین هفته های ۱۰ تا ۱۳) است.

آزمون های غربالگری بیماری های متابولیک در نوزادان

خوشبختانه امروزه می توان با گرفتن مقدار کمی خون از نوزاد از وجود چند اختلال متابولیک مهم مطلع شد و

قابل توجه بانوان باردار

انجام تست چالش گلوکز (GCT) که یک تست یک مرحله‌ای است برای تشخیص زود هنگام دیابت حاملگی به تمامی مادران باردار در هفته ۲۴ تا ۲۸ حاملگی توصیه می‌شود.

- انجام این آزمایش نیاز به ناشتا بودن ندارد.

- دقیقاً یک ساعت پس از شروع مصرف محلول قند نمونه خون از بیمار گرفته شده و میزان قند اندازه گیری شده به عنوان GCT گزارش می‌شود.

نحوه انجام:
- ۵۰ گرم گلوکز خوراکی به خانم باردار داده می‌شود.



الفبای مراجعه به آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

تمام حقوق مادی و معنوی این کتاب برای ناشر محفوظ است.
تجربیش - دلشیب - خیلابن رمضانی - کوی مرتضی عباسی - پلاک ۳ - واحد ۲
تلفن: ۰۱۰-۲۲۷۷۹۰۱ - ۰۲-۲۲۷۷۹۵۲۲ - تلفاکس: ۰۲-۲۲۷۷۹۰۲

ناشر: انتشارات میرمام
لیتوگرافی و چاپ: قائم چاپ جوربند
تهریه کننده: واحد آموزش انتشارات میرمام
صحافی: عطف
قیمت: ۳۰۰۰ ریال
نوبت چاپ: اول/۱۳۹۱
شمارگان: ۱۰۰۰ جلد
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۰-۵۰۹
گرافیک: مهدیه نظام زاده

عنوان و نام پدیدآور : الفبای مراجعه به آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی / تهیه کننده واحد آموزش انتشارات میرمام

وضعیت ویراست : ویراست ۲.

مشخصات نشر : تهران: میرمام، ۱۳۹۱.

مشخصات ظاهری : ۸ ص: مصور (رنگی).

شابک : ۳۰۰۰ ریال: ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۴۰-۵۰۹

وضعیت فهرست نویسی : فیبا

یادداشت : اولین ویراست کتاب حاضر تحت عنوان «راهنمای آمادگی‌های ضروری برای مراجعین آزمایشگاه‌های پزشکی» توسط همین ناشر در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است.

عنوان دیگر : راهنمای آمادگی‌های ضروری برای مراجعین آزمایشگاه‌های پزشکی

موضوع : آزمایش‌های پزشکی دوره‌ای — به زبان ساده

شناسه افزوده : انتشارات میرمام

ردی بندی کنگره : RC ۷۱/۴/۲ ۱۳۹۱

ردی بندی دیوبی : ۶۱۶/۷۵

شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۱۹۵۸۰